

# LHCb

**Wat doen wij?**




Niels Tuning – 4 juni 2019

# LHCb

- Waarom deeltjesfysica?
- Waarom LHCb?
- Resultaten
- Higgs en LHCb


# Deeltjesfysica

Bestudeert de natuur op afstanden  $< 10^{-15}$  m



Quantum theorie beschrijft alle metingen tot  $10^{-18}$  m  
(Ter vergelijking:  $10^{+18}$  m = 100 lichtjaar)

# Machten van tien ...




Heelal  
 $10^{26}$  m

Spin  
 $10^{-2}$  m




Melkweg  
 $10^{21}$  m

Atoom  
 $10^{-10}$  m




Zonnestelsel  
 $10^{13}$  m

Kern  
 $10^{-15}$  m




Aarde  
 $10^7$  m

Botsingen  
 $10^{-18}$  m



# Schaal




# De stand van zaken in 2019



[http:// pdg.lbl.gov](http://pdg.lbl.gov)

# De elementaire deeltjes




up




down



elektron





*Proton*



*Neutron*

# Wat kan je maken van deze 3 bouwstenen?



periodiek systeem  
van Mendeleev

1 H																	2 He
3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
55 Cs	56 Ba	71 Lu	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra	103 Lr	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt									

57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb
89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No

Alles!



# De elementaire deeltjes

Niet één serie, maar drie!


I      II      III

quarks

<b>u</b>	<b>c</b> (1976)	<b>t</b> (1995)
<b>d</b>	<b>s</b> (1947)	<b>b</b> (1978)

leptons

<b>e</b> (1895)	<b><math>\mu</math></b> (1936)	<b><math>\tau</math></b> (1973)
<b><math>\nu_e</math></b> (1956)	<b><math>\nu_\mu</math></b> (1963)	<b><math>\nu_\tau</math></b> (2000)



# De elementaire deeltjes

Generatie:

I

II

III

Lading

quarks

**u**

**c**  
(1976)

**t**  
(1995)

+2/3 e

**d**

**s**  
(1947)

**b**  
(1978)

-1/3 e

leptons

**e**  
(1895)

**$\mu$**   
(1936)

**$\tau$**   
(1973)

-1 e


**$\nu_e$**   
(1956)

**$\nu_\mu$**   
(1963)

**$\nu_\tau$**   
(2000)

0 e


Materie



# Is dit alles?

Generatie:

	I	II	III	<u>Lading</u>
quarks	<b>u</b> (1976)	<b>c</b> (1976)	<b>t</b> (1995)	+2/3 e
	<b>d</b> (1947)	<b>s</b> (1947)	<b>b</b> (1978)	-1/3 e
leptons	<b>e</b> (1895)	<b>μ</b> (1936)	<b>τ</b> (1973)	-1 e
	<b>ν<sub>e</sub></b> (1956)	<b>ν<sub>μ</sub></b> (1963)	<b>ν<sub>τ</sub></b> (2000)	0 e



Materie


# Anti-materie

Revoluties begin vorige eeuw:

- Relativiteitstheorie
- Quantum Mechanica

Paul Dirac (1928): relativistische quantum theorie!

Voor elk materiedeeltje bestaat een anti-materiedeeltje!



Anti-materie deeltje:

- Zelfde massa
- Tegenovergestelde lading

# De elementaire deeltjes

	I	II	III	<u>Lading</u>
quarks	<b>u</b> (1976)	<b>c</b> (1976)	<b>t</b> (1995)	+2/3 e
	<b>d</b>	<b>s</b> (1947)	<b>b</b> (1978)	-1/3 e
leptons	<b>e</b> (1895)	<b>μ</b> (1936)	<b>τ</b> (1973)	-1 e
	<b>ν<sub>e</sub></b> (1956)	<b>ν<sub>μ</sub></b> (1963)	<b>ν<sub>τ</sub></b> (2000)	0 e

Materie

# De elementaire deeltjes

quarks

I	II	III	<u>Lading</u>
<b>u</b>	<b>c</b> <i>(1976)</i>	<b>t</b> <i>(1995)</i>	+2/3 e
<b>d</b>	<b>s</b> <i>(1947)</i>	<b>b</b> <i>(1978)</i>	-1/3 e

leptons


<b>e</b> <i>(1895)</i>	<b>μ</b> <i>(1936)</i>	<b>τ</b> <i>(1973)</i>	-1 e
<b>ν<sub>e</sub></b> <i>(1956)</i>	<b>ν<sub>μ</sub></b> <i>(1963)</i>	<b>ν<sub>τ</sub></b> <i>(2000)</i>	0 e

Materie

<u>Lading</u>	I	II	III
-2/3 e	<b>ū</b>	<b>c̄</b>	<b>t̄</b>
+1/3 e	<b>d̄</b>	<b>s̄</b>	<b>b̄</b>
+1 e	<b>ē</b>	<b>μ̄</b>	<b>τ̄</b>
0 e	<b>ν̄<sub>e</sub></b>	<b>ν̄<sub>μ</sub></b>	<b>ν̄<sub>τ</sub></b>

Anti-materie




# Hoe maak je anti-materie??





Albert Einstein:  
 $E=mc^2$

materie + antimaterie = licht !

(en vice versa)



# Anti-materie in ziekenhuizen: de PET-scan






**Wat snappen we nog niet:**




# I. Wat snappen we nog niet? “*Anti-materie*”

Waar is de anti-materie gebleven?

*Geen anti-materie  
met satellieten*



*Geen anti-materie  
sterrenstelsels*



## II. Wat snappen we nog niet? “Higgs”

(Gedeeltelijk beantwoord op 4 juli 2012 !)

### Massa van deeltjes



### Bijzondere voorspelling:

#### Het Higgs boson:

zorgt ervoor dat deeltjes massa kunnen hebben in de theorie

Neutrino's

- Elektron
- Muon
- Tau



up, down, strange

● charm




Top quark




bottom


# III. Wat snappen we nog niet? “Donkere materie”




Temperatuurfluctuaties  
structuur van het heelal



Rotatie-curves




Gravitationele lens



Wat is de  
donkere materie ?

We hebben al die tijd maar 4% van het heelal bestudeerd!

# Wat snappen we niet? Drie Grote Vragen




Astronomie

Deeltjes  
fysica



Fundamenteel  
(nieuwsgierigheid gedreven)  
onderzoek







# Klassiek botsen

# Quantummechanisch botsen






# Wat verwacht je ?



$$\begin{aligned}
 & -\frac{1}{2}\partial_\nu g_\mu^a \partial_\nu g_\mu^a - g_s f^{abc} \partial_\mu g_\nu^a g_\mu^b g_\nu^c - \frac{1}{4}g_s^2 f^{abc} f^{ade} g_\mu^b g_\nu^c g_\mu^d g_\nu^e + \\
 & \frac{1}{2}ig_s^2 (\bar{q}^c \gamma^\mu q_j^c) g_\mu^a + \bar{G}^a \partial^2 G^a + g_s f^{abc} \partial_\mu G^a G^b g_\mu^c - \partial_\nu W_\mu^+ \partial_\nu W_\mu^- - \\
 & M^2 W_\mu^+ W_\mu^- - \frac{1}{2}\partial_\nu Z_\mu^0 \partial_\nu Z_\mu^0 - \frac{1}{2c_w^2} M^2 Z_\mu^0 Z_\mu^0 - \frac{1}{2}\partial_\mu A_\nu \partial_\mu A_\nu - \frac{1}{2}\partial_\mu H \partial_\mu H - \\
 & \frac{1}{2}m_h^2 H^2 - \partial_\mu \phi^+ \partial_\mu \phi^- - M^2 \phi^+ \phi^- - \frac{1}{2}\partial_\mu \phi^0 \partial_\mu \phi^0 - \frac{1}{2c_w^2} M \phi^0 \phi^0 - \beta_h \left[ \frac{2M^2}{g^2} + \right. \\
 & \left. \frac{2M}{g} H + \frac{1}{2}(H^2 + \phi^0 \phi^0 + 2\phi^+ \phi^-) \right] + \frac{2M^4}{g^2} \alpha_h - igc_w [\partial_\nu Z_\mu^0 (W_\mu^+ W_\nu^- - \\
 & W_\nu^+ W_\mu^-) - Z_\nu^0 (W_\mu^+ \partial_\nu W_\mu^- - W_\mu^- \partial_\nu W_\mu^+) + Z_\mu^0 (W_\nu^+ \partial_\nu W_\mu^- - \\
 & W_\nu^- \partial_\nu W_\mu^+)] - ig s_w [\partial_\nu A_\mu (W_\mu^+ W_\nu^- - W_\nu^+ W_\mu^-) - A_\nu (W_\mu^+ \partial_\nu W_\mu^- - \\
 & W_\mu^- \partial_\nu W_\mu^+) + A_\mu (W_\nu^+ \partial_\nu W_\mu^- - W_\nu^- \partial_\nu W_\mu^+)] - \frac{1}{2}g^2 W_\mu^+ W_\mu^- W_\nu^+ W_\nu^- + \\
 & \frac{1}{2}g^2 W_\mu^+ W_\nu^- W_\mu^+ W_\nu^- + g^2 c_w^2 (Z_\mu^0 W_\mu^+ Z_\nu^0 W_\nu^- - Z_\mu^0 Z_\nu^0 W_\mu^+ W_\nu^-) + \\
 & g^2 s_w^2 (A_\mu W_\mu^+ A_\nu W_\nu^- - A_\mu A_\nu W_\mu^+ W_\nu^-) + g^2 s_w c_w [A_\mu Z_\nu^0 (W_\mu^+ W_\nu^- - \\
 & W_\nu^+ W_\mu^-) - 2A_\mu Z_\mu^0 W_\nu^+ W_\nu^-] - g\alpha [H^3 + H\phi^0 \phi^0 + 2H\phi^+ \phi^-] - \\
 & \frac{1}{8}g^2 \alpha_h [H^4 + (\phi^0)^4 + 4(\phi^+ \phi^-)^2 + 4(\phi^0)^2 \phi^+ \phi^- + 4H^2 \phi^+ \phi^- + 2(\phi^0)^2 H^2] - \\
 & gM W_\mu^+ W_\mu^- H - \frac{1}{2}g \frac{M}{c_w^2} Z_\mu^0 Z_\mu^0 H - \frac{1}{2}ig [W_\mu^+ (\phi^0 \partial_\mu \phi^- - \phi^- \partial_\mu \phi^0) - \\
 & W_\mu^- (\phi^0 \partial_\mu \phi^+ - \phi^+ \partial_\mu \phi^0)] + \frac{1}{2}g [W_\mu^+ (H \partial_\mu \phi^- - \phi^- \partial_\mu H) - W_\mu^- (H \partial_\mu \phi^+ - \\
 & \phi^+ \partial_\mu H)] + \frac{1}{2}g \frac{1}{c_w} (Z_\mu^0 (H \partial_\mu \phi^0 - \phi^0 \partial_\mu H) - ig \frac{s_w^2}{c_w} M Z_\mu^0 (W_\mu^+ \phi^- - W_\mu^- \phi^+) + \\
 & ig s_w M A_\mu (W_\mu^+ \phi^- - W_\mu^- \phi^+) - ig \frac{1-2c_w^2}{2c_w} Z_\mu^0 (\phi^+ \partial_\mu \phi^- - \phi^- \partial_\mu \phi^+) + \\
 & ig s_w A_\mu (\phi^+ \partial_\mu \phi^- - \phi^- \partial_\mu \phi^+) - \frac{1}{4}g^2 W_\mu^+ W_\mu^- [H^2 + (\phi^0)^2 + 2\phi^+ \phi^-] - \\
 & \frac{1}{4}g^2 \frac{1}{c_w^2} Z_\mu^0 Z_\mu^0 [H^2 + (\phi^0)^2 + 2(2s_w^2 - 1)^2 \phi^+ \phi^-] - \frac{1}{2}g^2 \frac{s_w^2}{c_w} Z_\mu^0 \phi^0 (W_\mu^+ \phi^- + \\
 & W_\mu^- \phi^+) - \frac{1}{2}ig^2 \frac{s_w^2}{c_w} Z_\mu^0 H (W_\mu^+ \phi^- - W_\mu^- \phi^+) + \frac{1}{2}g^2 s_w A_\mu \phi^0 (W_\mu^+ \phi^- + \\
 & W_\mu^- \phi^+) + \frac{1}{2}ig^2 s_w A_\mu H (W_\mu^+ \phi^- - W_\mu^- \phi^+) - g^2 \frac{s_w}{c_w} (2c_w^2 - 1) Z_\mu^0 A_\mu \phi^+ \phi^- - \\
 & g^2 s_w^2 A_\mu A_\mu \phi^+ \phi^- - \bar{e}^\lambda (\gamma \partial + m_e^\lambda) e^\lambda - \bar{\nu}^\lambda \gamma \partial \nu^\lambda - \bar{u}_j^\lambda (\gamma \partial + m_u^\lambda) u_j^\lambda - \\
 & \bar{d}_j^\lambda (\gamma \partial + m_d^\lambda) d_j^\lambda + ig s_w A_\mu [-(\bar{e}^\lambda \gamma^\mu e^\lambda) + \frac{2}{3}(\bar{u}_j^\lambda \gamma^\mu u_j^\lambda) - \frac{1}{3}(\bar{d}_j^\lambda \gamma^\mu d_j^\lambda)] + \\
 & \frac{ig}{4c_w} Z_\mu^0 [(\bar{\nu}^\lambda \gamma^\mu (1 + \gamma^5) \nu^\lambda) + (\bar{e}^\lambda \gamma^\mu (4s_w^2 - 1 - \gamma^5) e^\lambda) + (\bar{u}_j^\lambda \gamma^\mu (\frac{4}{3}s_w^2 - \\
 & 1 - \gamma^5) u_j^\lambda) + (\bar{d}_j^\lambda \gamma^\mu (1 - \frac{8}{3}s_w^2 - \gamma^5) d_j^\lambda)] + \frac{ig}{2\sqrt{2}} W_\mu^+ [(\bar{\nu}^\lambda \gamma^\mu (1 + \gamma^5) e^\lambda) + \\
 & (\bar{u}_j^\lambda \gamma^\mu (1 + \gamma^5) C_{\lambda\kappa} d_j^\kappa)] + \frac{ig}{2\sqrt{2}} W_\mu^- [(\bar{e}^\lambda \gamma^\mu (1 + \gamma^5) \nu^\lambda) + (\bar{d}_j^\kappa C_{\lambda\kappa}^\dagger \gamma^\mu (1 + \\
 & \gamma^5) u_j^\lambda)] + \frac{ig}{2\sqrt{2}} \frac{m_\lambda^\lambda}{M} [-\phi^+ (\bar{\nu}^\lambda (1 - \gamma^5) e^\lambda) + \phi^- (\bar{e}^\lambda (1 + \gamma^5) \nu^\lambda)] - \\
 & \frac{g}{2} \frac{m_\lambda^\lambda}{M} [H (\bar{e}^\lambda e^\lambda) + i\phi^0 (\bar{e}^\lambda \gamma^5 e^\lambda)] + \frac{ig}{2M\sqrt{2}} \phi^+ [-m_d^\kappa (\bar{u}_j^\lambda C_{\lambda\kappa} (1 - \gamma^5) d_j^\kappa) + \\
 & m_u^\kappa (\bar{u}_j^\lambda C_{\lambda\kappa} (1 + \gamma^5) d_j^\kappa)] + \frac{ig}{2M\sqrt{2}} \phi^- [m_d^\lambda (\bar{d}_j^\kappa C_{\lambda\kappa}^\dagger (1 + \gamma^5) u_j^\kappa) - m_u^\kappa (\bar{d}_j^\kappa C_{\lambda\kappa}^\dagger (1 - \\
 & \gamma^5) u_j^\kappa) - \frac{g}{2} \frac{m_\lambda^\lambda}{M} H (\bar{u}_j^\lambda u_j^\lambda) - \frac{g}{2} \frac{m_\lambda^\lambda}{M} H (\bar{d}_j^\lambda d_j^\lambda) + \frac{ig}{2} \frac{m_\lambda^\lambda}{M} \phi^0 (\bar{u}_j^\lambda \gamma^5 u_j^\lambda) - \\
 & \frac{ig}{2} \frac{m_\lambda^\lambda}{M} \phi^0 (\bar{d}_j^\lambda \gamma^5 d_j^\lambda) + \bar{X}^+ (\partial^2 - M^2) X^+ + \bar{X}^- (\partial^2 - M^2) X^- + \bar{X}^0 (\partial^2 - \\
 & \frac{M^2}{c_w^2}) X^0 + \bar{Y} \partial^2 Y + igc_w W_\mu^+ (\partial_\mu \bar{X}^0 X^- - \partial_\mu \bar{X}^+ X^0) + ig s_w W_\mu^+ (\partial_\mu \bar{Y} X^- - \\
 & \partial_\mu \bar{X}^+ Y) + igc_w W_\mu^- (\partial_\mu \bar{X}^- X^0 - \partial_\mu \bar{X}^0 X^+) + ig s_w W_\mu^- (\partial_\mu \bar{X}^- Y - \\
 & \partial_\mu \bar{Y} X^+) + igc_w Z_\mu^0 (\partial_\mu \bar{X}^+ X^+ - \partial_\mu \bar{X}^- X^-) + ig s_w A_\mu (\partial_\mu \bar{X}^+ X^+ - \\
 & \partial_\mu \bar{X}^- X^-) - \frac{1}{2}gM [\bar{X}^+ X^+ H + \bar{X}^- X^- H + \frac{1}{c_w^2} \bar{X}^0 X^0 H] + \\
 & \frac{1-2c_w^2}{2c_w} igM [\bar{X}^+ X^0 \phi^+ - \bar{X}^- X^0 \phi^-] + \frac{1}{2c_w} igM [\bar{X}^0 X^- \phi^+ - \bar{X}^0 X^+ \phi^-] + \\
 & igM s_w [\bar{X}^0 X^- \phi^+ - \bar{X}^0 X^+ \phi^-] + \frac{1}{2}igM [\bar{X}^+ X^+ \phi^0 - \bar{X}^- X^- \phi^0]
 \end{aligned}$$

Al 40 jaar bestaan er precieze wiskundige voorspellingen!


$$E = mc^2$$

# Hoe ontdekken we nieuwe deeltjes?

Bij de LHC op Cern:  
1) Verander energie in materie!





$$E = mc^2$$

# Hoe ontdekken we nieuwe deeltjes?

Bij de LHC op Cern:

- 1) Verander energie in materie!
- 2) Nieuwe deeltjes veranderen voorspellingen





*LHCb*

*ATLAS*

*CMS*

*ALICE*

An aerial photograph of a vast, green landscape with a large red oval overlaid on it, representing the LHC tunnel. The oval has several small red circles along its perimeter. Two blue boxes with white text are positioned above the oval. Two blue boxes with white text are positioned below the oval. The background shows rolling hills and a range of snow-capped mountains under a clear blue sky.


2) Nieuwe deeltjes  
veranderen voorspellingen

1) Verander energie in  
materie

*LHCb*

*ATLAS*

# The LHCb Detector



23 sep 2010  
Run 79646



19:49:24  
Event 143858637

HAZARD  
DANGER


$$\begin{aligned}
& -\frac{1}{2}\partial_\nu g_\mu^a \partial_\nu g_\mu^a - g_s f^{abc} \partial_\mu g_\nu^a g_\mu^b g_\nu^c - \frac{1}{2}g_s^2 f^{abc} f^{ade} g_\mu^b g_\nu^c g_\mu^d g_\nu^e + \\
& \frac{1}{2}ig_s^2 (\bar{q}^i \gamma_\mu q_j^i) g_\mu^a + G^a \partial^2 G^a + g_s f^{abc} \partial_\mu G^a G^b g_\mu^c - \partial_\nu W_\mu^+ \partial_\nu W_\mu^- - \\
& M^2 W_\mu^+ W_\mu^- - \frac{1}{2}\partial_\nu Z_\mu^0 \partial_\nu Z_\mu^0 - \frac{1}{2c_w^2} M^2 Z_\mu^0 Z_\mu^0 - \frac{1}{2}\partial_\nu A_\nu \partial_\nu A_\nu - \frac{1}{2}\partial_\nu H \partial_\nu H - \\
& \frac{1}{2}m_h^2 H^2 - \partial_\mu \phi^+ \partial_\mu \phi^- - M^2 \phi^+ \phi^- - \frac{1}{2}\partial_\mu \phi^0 \partial_\mu \phi^0 - \frac{1}{2c_w^2} M \phi^0 \phi^0 - \beta_h \left[ \frac{2M^2}{g^2} + \right. \\
& \left. \frac{2M}{g} H + \frac{1}{2}(H^2 + \phi^0 \phi^0 + 2\phi^+ \phi^-) \right] + \frac{2M^2}{g^2} \alpha_h - ig_{cw} [\partial_\nu Z_\mu^0 (W_\mu^+ W_\nu^- - \\
& W_\nu^+ W_\mu^-) - Z_\mu^0 (W_\nu^+ \partial_\nu W_\mu^- - W_\mu^- \partial_\nu W_\nu^+) + Z_\mu^0 (W_\nu^- \partial_\nu W_\mu^+ - \\
& W_\mu^+ \partial_\nu W_\nu^-)] - ig_{sw} [\partial_\nu A_\mu (W_\nu^+ W_\mu^- - W_\mu^- W_\nu^+) - A_\nu (W_\mu^+ \partial_\nu W_\mu^- - \\
& W_\nu^- \partial_\mu W_\mu^+) + A_\mu (W_\nu^- \partial_\nu W_\mu^+ - W_\mu^+ \partial_\nu W_\nu^-)] - \frac{3}{2}g^2 W_\mu^+ W_\nu^- W_\nu^+ W_\mu^- + \\
& \frac{1}{2}g^2 W_\mu^+ W_\nu^- W_\nu^+ W_\mu^- + g^2 s_w^2 (Z_\mu^0 W_\nu^+ Z_\nu^0 W_\mu^- - Z_\mu^0 Z_\nu^0 W_\nu^+ W_\mu^-) + \\
& g^2 s_w^2 (A_\mu W_\nu^+ A_\nu W_\mu^- - A_\mu A_\nu W_\nu^+ W_\mu^-) + g^2 s_w c_w [A_\mu Z_\nu^0 (W_\mu^+ W_\nu^- - \\
& W_\nu^+ W_\mu^-) - 2A_\nu Z_\mu^0 (W_\nu^+ W_\mu^-)] - g\alpha [H^2 + H \phi^0 \phi^0 + 2H \phi^+ \phi^-] - \\
& \frac{1}{8}g^2 \alpha_h [H^4 + (\phi^0)^4 + 4(\phi^+ \phi^-)^2 + 4(\phi^0)^2 \phi^+ \phi^- + 4H^2 \phi^+ \phi^- + 2(\phi^0)^2 H^2] - \\
& gM W_\mu^+ W_\nu^- H - \frac{1}{2}g \frac{M}{c_w} Z_\mu^0 Z_\nu^0 H - \frac{1}{2}ig [W_\mu^+ (\phi^0 \partial_\nu \phi^- - \phi^- \partial_\nu \phi^0) - \\
& W_\nu^- (\phi^0 \partial_\mu \phi^+ - \phi^+ \partial_\mu \phi^0)] + \frac{1}{2}g [W_\mu^+ (H \partial_\mu \phi^- - \phi^- \partial_\mu H) - W_\nu^- (H \partial_\nu \phi^+ - \\
& \phi^+ \partial_\nu H)] + \frac{1}{2}g \frac{1}{c_w} [Z_\mu^0 (H \partial_\mu \phi^0 - \phi^0 \partial_\mu H) - ig_{cw}^2 M Z_\mu^0 (W_\mu^+ \phi^- - W_\mu^- \phi^+) + \\
& ig_{sw} M A_\mu (W_\mu^+ \phi^- - W_\mu^- \phi^+) - ig \frac{2c_w}{2c_w} Z_\mu^0 (\phi^+ \partial_\mu \phi^- - \phi^- \partial_\mu \phi^+) + \\
& ig_{sw} A_\mu (\phi^+ \partial_\mu \phi^- - \phi^- \partial_\mu \phi^+) - \frac{1}{4}g^2 W_\mu^+ W_\nu^- [H^2 + (\phi^0)^2 + 2\phi^+ \phi^-] - \\
& \frac{1}{2}g^2 \frac{1}{c_w} Z_\mu^0 Z_\nu^0 [H^2 + (\phi^0)^2 + 2(2s_w^2 - 1)^2 \phi^+ \phi^-] - \frac{1}{2}g^2 \frac{2c_w}{c_w} Z_\mu^0 \phi^0 (W_\mu^+ \phi^- + \\
& W_\mu^- \phi^+) - \frac{1}{2}ig^2 \frac{2c_w}{c_w} Z_\mu^0 H (W_\mu^+ \phi^- - W_\mu^- \phi^+) + \frac{1}{2}g^2 s_w A_\mu \phi^0 (W_\mu^+ \phi^- + \\
& W_\mu^- \phi^+) + \frac{1}{2}ig^2 s_w A_\mu H (W_\mu^+ \phi^- - W_\mu^- \phi^+) - g^2 \frac{2c_w}{c_w} (2c_w^2 - 1) Z_\mu^0 A_\nu \phi^+ \phi^- - \\
& g^4 s_w^2 A_\mu A_\nu \phi^+ \phi^- - \bar{e}^\lambda (\gamma^\partial + m_e^\lambda) e^\lambda - \bar{\nu}^\lambda \gamma^\partial \nu^\lambda - \bar{u}_j^\lambda (\gamma^\partial + m_u^\lambda) u_j^\lambda - \\
& \bar{d}_j^\lambda (\gamma^\partial + m_d^\lambda) d_j^\lambda + ig_{sw} A_\mu [-(\bar{e}^\lambda \gamma^\mu e^\lambda) + \frac{2}{3}(\bar{u}_j^\lambda \gamma^\mu u_j^\lambda) - \frac{1}{3}(\bar{d}_j^\lambda \gamma^\mu d_j^\lambda)] + \\
& \frac{ig}{4c_w} Z_\mu^0 [(\bar{\nu}^\lambda \gamma^\mu (1 + \gamma^5) \nu^\lambda) + (\bar{e}^\lambda \gamma^\mu (4s_w^2 - 1 - \gamma^5) e^\lambda) + (\bar{u}_j^\lambda \gamma^\mu (\frac{4}{3}s_w^2 - \\
& 1 - \gamma^5) u_j^\lambda) + (\bar{d}_j^\lambda \gamma^\mu (1 - \frac{8}{3}s_w^2 - \gamma^5) d_j^\lambda)] + \frac{ig}{2\sqrt{2}} W_\mu^+ [(\bar{\nu}^\lambda \gamma^\mu (1 + \gamma^5) e^\lambda) + \\
& (\bar{u}_j^\lambda \gamma^\mu (1 + \gamma^5) C_{\lambda k} d_k^\lambda)] + \frac{ig}{2\sqrt{2}} W_\mu^- [(\bar{e}^\lambda \gamma^\mu (1 + \gamma^5) \nu^\lambda) + (\bar{d}_j^\lambda \gamma^\mu (1 + \\
& \gamma^5) u_j^\lambda)] + \frac{ig}{2\sqrt{2}} \frac{m_e^\lambda}{M} [-\phi^+ (\bar{\nu}^\lambda (1 - \gamma^5) e^\lambda) + \phi^- (\bar{e}^\lambda (1 + \gamma^5) \nu^\lambda)] - \\
& \frac{g}{2} \frac{m_e^\lambda}{M} [H (\bar{e}^\lambda e^\lambda) + i\phi^0 (\bar{e}^\lambda \gamma^5 e^\lambda)] + \frac{ig}{2M\sqrt{2}} \phi^+ [-m_e^\lambda (\bar{u}_j^\lambda C_{\lambda k} (1 - \gamma^5) d_k^\lambda) + \\
& m_e^\lambda (\bar{d}_j^\lambda C_{\lambda k} (1 + \gamma^5) u_j^\lambda)] + \frac{ig}{2M\sqrt{2}} \phi^- [m_d^\lambda (\bar{d}_j^\lambda C_{\lambda k}^1 (1 + \gamma^5) u_j^\lambda) - m_u^\lambda (\bar{d}_j^\lambda C_{\lambda k}^1 (1 - \\
& \gamma^5) u_j^\lambda)] - \frac{g}{2} \frac{m_d^\lambda}{M} H (\bar{u}_j^\lambda u_j^\lambda) - \frac{g}{2} \frac{m_d^\lambda}{M} H (\bar{d}_j^\lambda d_j^\lambda) + \frac{ig}{2} \frac{m_d^\lambda}{M} \phi^0 (\bar{u}_j^\lambda \gamma^5 u_j^\lambda) - \\
& \frac{ig}{2} \frac{m_d^\lambda}{M} \phi^0 (\bar{d}_j^\lambda \gamma^5 d_j^\lambda) + \bar{X}^+ (\partial^2 - M^2) X^+ + \bar{X}^- (\partial^2 - M^2) X^- + \bar{X}^0 (\partial^2 - \\
& \frac{M^2}{c_w^2}) X^0 + \bar{Y} \partial^2 Y + ig_{cw} W_\mu^+ (\partial_\mu \bar{X}^0 X^- - \partial_\nu \bar{X}^+ X^0) + ig_{sw} W_\mu^+ (\partial_\mu \bar{Y} X^- - \\
& \partial_\nu \bar{X}^+ Y) + ig_{cw} W_\nu^- (\partial_\mu \bar{X}^- X^0 - \partial_\mu \bar{X}^0 X^+) + ig_{sw} W_\nu^- (\partial_\mu \bar{X}^- Y - \\
& \partial_\mu \bar{Y} X^+) + ig_{cw} Z_\mu^0 (\partial_\mu \bar{X}^+ X^+ - \partial_\nu \bar{X}^- X^-) + ig_{sw} A_\mu (\partial_\mu \bar{X}^+ X^+ - \\
& \partial_\mu \bar{X}^- X^-) - \frac{1}{2}gM [\bar{X}^+ X^+ H + \bar{X}^- X^- H + \frac{1}{c_w} \bar{X}^0 X^0 H] + \\
& \frac{1-2c_w^2}{2c_w} igM [\bar{X}^+ X^0 \phi^+ - \bar{X}^- X^0 \phi^-] + \frac{1}{2c_w} igM [\bar{X}^0 X^- \phi^+ - \bar{X}^0 X^+ \phi^-] + \\
& igM s_w [\bar{X}^0 X^- \phi^- - \bar{X}^0 X^+ \phi^+] + \frac{1}{2}igM [\bar{X}^+ X^+ \phi^0 - \bar{X}^- X^- \phi^0]
\end{aligned}$$

# Quantummechanisch botsen

proton



proton



# LHCb in getallen

**120,000 B events per sec**


(ter vergelijking: in ATLAS : 1 Higgs in 100 sec)

**$10^{11}$  B events in 2011**

(ter vergelijking: Babar heeft in totaal  $10^9$  B events)

**3 kHz naar tape**


(ter vergelijking: ATLAS schrijft 200 Hz weg)






# LHCb: bestuderen van $B$ deeltje


1) Vind verschillen tussen materie en anti-materie




2) Vind nieuwe deeltjes



# LHCb: bestuderen van $B$ deeltje





# LHCb: bestuderen van $B$ deeltje




## 2) Vind nieuwe deeltjes

$$B^0_s \rightarrow \mu\mu$$




# LHCb: bestuderen van $B$ deeltje




Slechts 3 op de miljard  $B$  deeltjes vervalst naar 2 muonen

Bestaan er nieuwe deeltjes?




# LHCb: bestuderen van $B$ deeltje




Slechts 3 op de miljard  $B$  deeltjes vervalt naar 2 muonen

Bestaan er nieuwe deeltjes?




# LHCb: bestuderen van $B$ deeltje




Slechts 3 op de miljard  $B$  deeltjes vervalst naar 2 muonen

Bestaan er nieuwe deeltjes?




# LHCb: bestuderen van $B$ deeltje




Slechts 3 op de miljard  $B$  deeltjes vervalst naar 2 muonen

Bestaan er nieuwe deeltjes?



# LHCb: bestuderen van $B$ deeltje




$$\mathcal{B}(B_s^0 \rightarrow \mu^+ \mu^-) = (3.0 \pm 0.6_{-0.2}^{+0.3}) \times 10^{-9}$$

$$\mathcal{B}(B^0 \rightarrow \mu^+ \mu^-) < 3.4 \times 10^{-10}$$

Theory:

$$\mathcal{B}(B_s^0 \rightarrow \mu^+ \mu^-) = (3.65 \pm 0.23) \times 10^{-9}$$


$$\mathcal{B}(B^0 \rightarrow \mu^+ \mu^-) = (1.06 \pm 0.09) \times 10^{-10}$$






# LHCb: bestuderen van $B$ deeltje

1) Vind verschillen tussen materie en anti-materie



2) Vind nieuwe deeltjes



# LHCb: highlights



- 1) Nieuwe 'gewone' hadronen
- 2) Nieuwe 'exotische' hadronen: Tetraquark en pentaquark
- 3) Ontdekking 'CP schending'  $B_s$
- 4) Ontdekking 'CP schending' charm

## Hot topic:

- 5) Verschil electron, muon, tau??

# LHCb: nieuwe 'gewone' hadronen

(ccu):  $\Xi_{cc}^{++}$




**NewScientist**  
IDEEEN DIE DE WERELD VERANDEREN

## Nieuw zwaar deeltje legt sterke kernkracht op de pijnbank

12 juli 2017



**Jacob Aron en Leah Crane**









Het nieuwe deeltje bevat twee charm-quarks in het midden en een up-quark daaromheen. Beeld: Daniel Dominguez/CERN.

# LHCb: nieuwe 'gewone' hadronen

(ccu):  $\Xi_{cc}^{++}$


(buu):  $\Sigma_b(6097)^+$

(bdd):  $\Sigma_b(6097)^-$






# LHCb: nieuwe 'exotische' hadronen

$(c\bar{c}duu)$ :  **$P_c(4312)^+$**





$(c\bar{u}\bar{c}u)$ :  **$X(3842)$**



# LHCb: antimaterie verschil in $B_s^0$

CP schending in  $B_s^0$



# LHCb: antimaterie verschil in charm

“CP schending”

$D^0 \rightarrow K^+ K^-$  same as


$\bar{D}^0 \rightarrow K^+ K^-$  ??

at least it is different compared to  
 $D^0 \rightarrow \pi^+ \pi^- \dots$ :

$$\Delta A_{CP} = (-15.4 \pm 2.9) \times 10^{-4}$$



# LHCb: antimaterie verschillen



- |      |  |                   |
|------|--|-------------------|
| (ds) | <b>1964</b> : CP schending met $K^0$   | (Nobelprijs 1980) |
| (bd) | <b>2000</b> : CP schending met $B^0$   | (Nobelprijs 1998) |
| (bs) | <b>2012</b> : CP schending met $B_s^0$ |                   |
| (cu) | <b>2019</b> : CP schending met $D^0$   |                   |



# LHCb: highlights

- 1) Nieuwe 'gewone' hadronen
- 2) Nieuwe 'exotische' hadronen: Tetraquark en pentaquark
- 3) Ontdekking 'CP schending'  $B_s$
- 4) Ontdekking 'CP schending' charm

## Hot topic:

- 5) Verschil electron, muon, tau??

# LHCb: hot topic

**NewScientist**  
IDEEËN DIE DE WERELD VERANDEREN

## Cern vindt nieuwe hint voor scheurtjes in standaardmodel

19 april 2017



George van Hal




mogelijke hint dat er meer is dan alleen het standaardmodel. Beeld: Cern.

**de Volkskrant**

## CERN is 'voorzichtig opgewonden' over subtiele verschillen in deeltjeswereld

Een gevoel van 'voorzichtige opwinding' heeft zich meester gemaakt van deeltjesfysici van CERN in Genève. Dinsdag maakte de LHCb-detector daar bekend subtiele verschillen te zien tussen bepaalde deeltjes. De gangbare deeltjestheorie neemt aan dat deeltjes in essentie identiek zijn.

Martijn van Calmthout 19 april 2017, 21:29




Wellicht is de deeltjeswereld niet zo democratisch als vooraf gedacht werd. Beeld epa

**de Volkskrant**

## Moeder aller deeltjes: de zoektocht naar de leptoquark

Is het fundamenteelste deeltje in het universum altijd over het hoofd gezien? Komende week kan de wereld opgeschud worden, als natuurkundigen in Seoul hun resultaten bekendmaken. Leptoquark, onthoud dat woord.

Martijn van Calmthout 29 juni 2018, 11:25



Beeld Rein Janssen

# LHCb: hot topic


de Volkskrant

## Moeder aller deeltjes: de zoektocht naar de leptoquark

Is het fundamenteelste deeltje in het universum altijd over het hoofd gezien? Komende week kan de wereld opgeschud worden, als natuurkundigen in Seoul hun resultaten bekendmaken. Leptoquark, onthoud dat woord.

Martijn van Calmthout 29 juni 2018, 11:25

Maar de LHCb-metingen geven al jaren kleine hints dat er iets mis is met deze keurige lepton-universaliteit. En dat elektronen en muonen ergens diep van binnen toch net iets anders met quarks omgaan.



Beeld Rein Janssen

$t \rightarrow W^+ b$

$$BR(t \rightarrow Wb) = \frac{\Gamma(t \rightarrow Wb)}{\Gamma(t \rightarrow Wb) + \Gamma(t \rightarrow Wc) + \Gamma(t \rightarrow Ws)}$$




$$= \frac{|V_{cb}|^2}{|V_{cb}|^2 + |V_{cb}|^2 + |V_{cb}|^2}$$
$$\approx \frac{(0.9945)^2}{(0.0077)^2 + (0.04)^2 + (0.7745)^2}$$
$$= 99.82\%$$

but F.C.N.C...



$t \rightarrow Zc$   
 $t \rightarrow Zs$




$t \rightarrow \gamma c$   
 $t \rightarrow \gamma s$

$$U_{CKM} = \begin{pmatrix} c_{12}c_{13} & & \\ -s_{12}c_{13} & -c_{12}s_{13} & s_{13}e^{i\delta} \\ s_{12}c_{13} & c_{12}s_{13} & s_{13}e^{i\delta} \end{pmatrix}$$

INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGH-ENERGY PHYSICS


# CERN COURIER

VOLUME 55 NUMBER 9 NOVEMBER 2015






**Tensions in the Standard Model**

# LHCb: hot topic





# LHCb: hot topic

Electronen en muonen gedragen zich anders?



# LHCb: hot topic



Ook hoekverdeling is anders...





# LHCb: hot topic

En muonen en tau-deeltjes  
gedragen zich anders??




# LHCb: wat kan het zijn?

## Moeder aller deeltjes: de zoektocht naar de leptoquark


Is het fundamenteelste deeltje in het universum altijd over het hoofd gezien? Komende week kan de wereld opgeschud worden, als natuurkundigen in Seoul hun resultaten bekendmaken. Leptoquark, onthoud dat woord.

Martijn van Calmthout 29 juni 2018, 11:25





SM



SU(2)'




Leptoquark



Leptoquark, onthoud dat woord.

# LHCb zoekt naar nieuwe deeltjes om antwoorden te zoeken op grote vragen




**Einde**

# Higgs en LHCb

# Wat snappen we nog niet?

## Massa van deeltjes



## Bijzondere voorspelling:


### Het Higgs boson:

zorgt ervoor dat deeltjes massa kunnen hebben in de theorie

### Neutrino's

- Elektron
- Muon
- Tau

● up, down, strange



# Wat is massa ?? Anno 1687


Massa is de 'wisselkoers' tussen kracht en versnelling:

$$F = m \times a$$

Beschrijft niet wat massa **is** ...



**Newton**




# Wat is massa ?? Anno 1905

Massa is energie

$$E = m \times c^2$$

Beschrijft wel wat massa **is** !

Maar niet waar het vandaan komt ...



**Einstein**

13. *Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?*  
von A. Einstein.

Die Resultate einer jüngst in diesen Annalen von mir publizierten elektrodynamischen Untersuchung<sup>1)</sup> führen zu einer sehr interessanten Folgerung, die hier abgeleitet werden soll. Ich legte dort die Maxwell-Hertz'schen Gleichungen für den leeren Raum nebst dem Maxwellschen Ausdruck für die elektromagnetische Energie des Raumes zugrunde und außerdem das Prinzip:

Die Gesetze, nach denen sich die Zustände der physikalischen Systeme ändern, sind unabhängig davon, auf welches von zwei relativ zueinander in gleichförmiger Parallel-Translationsbewegung befindlichen Koordinatensystemen diese Zustandsänderungen bezogen werden (Relativitätsprinzip).

Gestützt auf diese Grundlagen<sup>2)</sup> leitete ich unter anderem das nachfolgende Resultat ab (l. c. § 8):

Ein System von ebenen Lichtwellen besitze, auf das Koordinatensystem  $(x, y, z)$  bezogen, die Energie  $l$ ; die Strahlrichtung (Wellennormale) bilde den Winkel  $\varphi$  mit der  $x$ -Achse des Systems. Führt man ein neues, gegen das System  $(x, y, z)$  in gleichförmiger Paralleltranslation begriffenes Koordinatensystem  $(\xi, \eta, \zeta)$  ein, dessen Ursprung sich mit der Geschwindigkeit  $v$  längs der  $x$ -Achse bewegt, so besitzt die genannte Lichtmenge — im System  $(\xi, \eta, \zeta)$  gemessen — die Energie:

$$l^* = l \frac{1 - \frac{v}{V} \cos \varphi}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{V}\right)^2}}$$

wobei  $V$  die Lichtgeschwindigkeit bedeutet. Von diesem Resultat machen wir im folgenden Gebrauch.

1) A. Einstein, Ann. d. Phys. 17. p. 891. 1905.

2) Das dort benutzte Prinzip der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit ist natürlich in den Maxwellschen Gleichungen enthalten.







# Wat is massa ?? Anno 1964

Massa van elementaire deeltjes komt door  
"wrijving" met alomtegenwoordig 'Higgs veld'

$$m: \psi\psi H$$




$$\mathcal{L} = y_{ij} \psi_i \psi_j \phi$$



Nee, dit is niet Pierre, dit is John Ellis

# Modelleren van interactie

## Standaard Model Lagrangiaan


$$\begin{aligned}
 & -\frac{1}{2}\partial_\nu g_\mu^\alpha \partial_\nu g_\mu^\alpha - g_s f^{abc} \partial_\mu g_\mu^a g_\mu^b g_\mu^c - \frac{1}{4}g_s^2 f^{abc} f^{ade} g_\mu^a g_\mu^b g_\mu^c g_\mu^d g_\mu^e + \frac{1}{2}ig_\mu^2 (g_\mu^i \gamma^\mu g_\mu^j) g_\mu^k + \\
 & \bar{C}^a \partial^2 C^a + g_s f^{abc} \partial_\mu \bar{C}^a G^b G^c - \partial_\mu W_\mu^+ \partial_\nu W_\nu^- - M^2 W_\mu^+ W_\mu^- - \frac{1}{2}\partial_\mu Z_\mu^0 Z_\mu^0 - \frac{1}{2\epsilon_0^2} M^2 Z_\mu^0 Z_\mu^0 - \\
 & \frac{1}{2}\partial_\mu A_\nu \partial_\mu A_\nu - \frac{1}{2}\partial_\mu H \partial_\mu H - \frac{1}{2}m_H^2 H^2 - \partial_\mu \phi^+ \partial_\mu \phi^- - M^2 \phi^+ \phi^- - \frac{1}{2}\partial_\mu \phi^0 \partial_\mu \phi^0 - \\
 & \frac{1}{2\epsilon_0^2} M \phi^0 \phi^0 - \beta_h \left[ \frac{2M^2}{g^2} + \frac{2M}{g} H + \frac{1}{2}(H^2 + \phi^0 \phi^0 + 2\phi^+ \phi^-) \right] + \frac{2M^2}{g^2} \alpha_h - ig_{cw} [\partial_\mu Z_\mu^0 (W_\mu^+ W_\nu^- - \\
 & W_\mu^- W_\nu^+) - Z_\mu^0 (W_\mu^+ \partial_\nu W_\nu^- - W_\mu^- \partial_\nu W_\nu^+) + Z_\mu^0 (W_\nu^+ \partial_\nu W_\mu^- - W_\nu^- \partial_\nu W_\mu^+)] - ig_{sw} [\partial_\mu A_\nu (W_\mu^+ W_\nu^- - \\
 & W_\mu^- W_\nu^+) - A_\nu (W_\mu^+ \partial_\nu W_\nu^- - W_\mu^- \partial_\nu W_\nu^+) + A_\nu (W_\nu^+ \partial_\nu W_\mu^- - W_\nu^- \partial_\nu W_\mu^+)] - \frac{1}{2}g^2 W_\mu^+ W_\nu^- W_\nu^+ W_\mu^- + \\
 & \frac{1}{2}g^2 W_\mu^+ W_\nu^- W_\nu^+ W_\mu^- + g^2 c_w^2 (Z_\mu^0 W_\nu^+ Z_\nu^0 W_\mu^- - Z_\mu^0 Z_\nu^0 W_\nu^+ W_\mu^-) + g^2 s_w^2 (A_\mu W_\nu^+ A_\nu W_\mu^- - \\
 & A_\mu A_\nu W_\nu^+ W_\mu^-) + g^2 s_w c_w [A_\mu Z_\nu^0 (W_\mu^+ W_\nu^- - W_\mu^- W_\nu^+) - 2A_\nu Z_\mu^0 W_\nu^+ W_\mu^-] - g\alpha [H^3 + \\
 & H \phi^0 \phi^0 + 2H \phi^+ \phi^-] - \frac{1}{8}g^2 \alpha_h [H^4 + (\phi^0)^4 + 4(\phi^+ \phi^-)^2 + 4(\phi^0)^2 \phi^+ \phi^- + 4H^2 \phi^+ \phi^- + \\
 & 2(\phi^0)^2 H^2] - g M W_\mu^+ W_\nu^- H - \frac{1}{2}g \frac{M}{\epsilon_0^2} Z_\mu^0 Z_\nu^0 H - \frac{1}{2}ig [W_\mu^+ (\phi^0 \partial_\mu \phi^- - \phi^- \partial_\mu \phi^0) - W_\mu^- (\phi^0 \partial_\mu \phi^+ - \\
 & \phi^+ \partial_\mu \phi^0)] + \frac{1}{2}ig [W_\mu^+ (H \partial_\mu \phi^- - \phi^- \partial_\mu H) - W_\mu^- (H \partial_\mu \phi^+ - \phi^+ \partial_\mu H)] + \frac{1}{2}g \frac{1}{\epsilon_0^2} [Z_\mu^0 (H \partial_\mu \phi^0 - \\
 & \phi^0 \partial_\mu H) - ig_{cw} M Z_\mu^0 (W_\mu^+ \phi^- - W_\mu^- \phi^+) + ig_{sw} M A_\mu (W_\mu^+ \phi^- - W_\mu^- \phi^+) - ig \frac{1-2c_w^2}{2c_w} Z_\mu^0 (\phi^+ \partial_\mu \phi^- - \\
 & \phi^- \partial_\mu \phi^+) + ig_{sw} A_\mu (\phi^+ \partial_\mu \phi^- - \phi^- \partial_\mu \phi^+) - \frac{1}{4}g^2 W_\mu^+ W_\nu^- [H^2 + (\phi^0)^2 + 2\phi^+ \phi^-] - \\
 & \frac{1}{4}g^2 \frac{1}{c_w^2} Z_\mu^0 Z_\nu^0 [H^2 + (\phi^0)^2 + 2(2s_w^2 - 1)^2 \phi^+ \phi^-] - \frac{1}{2}g^2 \frac{s_w^2}{c_w} Z_\mu^0 \phi^0 (W_\mu^+ \phi^- + W_\mu^- \phi^+) - \\
 & \frac{1}{2}ig^2 \frac{s_w^2}{c_w} Z_\mu^0 H (W_\mu^+ \phi^- - W_\mu^- \phi^+) + \frac{1}{2}g^2 s_w A_\mu \phi^0 (W_\mu^+ \phi^- + W_\mu^- \phi^+) + \frac{1}{2}ig^2 s_w A_\nu H (W_\mu^+ \phi^- - \\
 & W_\mu^- \phi^+) - g^2 \frac{s_w}{c_w} (2c_w^2 - 1) Z_\mu^0 A_\nu \phi^+ \phi^- - g^2 s_w^2 A_\mu A_\nu \phi^+ \phi^- - e^\lambda (\gamma \partial + m_\Delta^2) e^\lambda - \\
 & \bar{\nu}^\lambda \gamma \partial \nu^\lambda - \bar{u}_2^j (\gamma \partial + m_\Delta^2) u_2^j - \bar{d}_2^j (\gamma \partial + m_\Delta^2) d_2^j + ig_{sw} A_\mu [-(e^\lambda \gamma^\mu e^\lambda) + \frac{2}{3}(\bar{u}_2^j \gamma^\mu u_2^j) - \\
 & \frac{1}{3}(\bar{d}_2^j \gamma^\mu d_2^j)] + \frac{ig}{4c_w} Z_\mu^0 [(\bar{\nu}^\lambda \gamma^\mu (1 + \gamma^5) \nu^\lambda) + (e^\lambda \gamma^\mu (4s_w^2 - 1 - \gamma^5) e^\lambda) + (\bar{u}_2^j \gamma^\mu (\frac{2}{3}s_w^2 - \\
 & 1 - \gamma^5) u_2^j) + (\bar{d}_2^j \gamma^\mu (1 - \frac{2}{3}s_w^2 - \gamma^5) d_2^j)] + \frac{ig}{2\sqrt{2}} W_\mu^+ [(\bar{\nu}^\lambda \gamma^\mu (1 + \gamma^5) e^\lambda) + (\bar{u}_2^j \gamma^\mu (1 + \\
 & \gamma^5) C_{\lambda\lambda} d_2^j) + \frac{ig}{2\sqrt{2}} W_\mu^- [(e^\lambda \gamma^\mu (1 + \gamma^5) \nu^\lambda) + (\bar{d}_2^j \gamma^\mu C_{\lambda\lambda} \gamma^\mu (1 + \gamma^5) u_2^j)] + \frac{ig}{2\sqrt{2}} \frac{m_\Delta^2}{M} [-\phi^+ (\bar{\nu}^\lambda (1 - \\
 & \gamma^5) e^\lambda) + \phi^- (e^\lambda (1 + \gamma^5) \nu^\lambda)] - \frac{g}{2} \frac{m_\Delta^2}{M} [H (e^\lambda e^\lambda) + i\phi^0 (e^\lambda \gamma^5 e^\lambda)] + \frac{ig}{2M\sqrt{2}} \phi^+ [-m_\Delta^2 (\bar{u}_2^j C_{\lambda\lambda} (1 - \\
 & \gamma^5) d_2^j) + m_\Delta^2 (\bar{u}_2^j C_{\lambda\lambda} (1 + \gamma^5) d_2^j)] + \frac{ig}{2M\sqrt{2}} \phi^- [m_\Delta^2 (\bar{d}_2^j C_{\lambda\lambda} (1 + \gamma^5) u_2^j) - m_\Delta^2 (\bar{d}_2^j C_{\lambda\lambda} (1 - \\
 & \gamma^5) u_2^j)] - \frac{g}{2} \frac{m_\Delta^2}{M} H (\bar{u}_2^j u_2^j) - \frac{g}{2} \frac{m_\Delta^2}{M} H (\bar{d}_2^j d_2^j) + \frac{ig}{2} \frac{m_\Delta^2}{M} \phi^0 (\bar{u}_2^j \gamma^5 u_2^j) - \frac{ig}{2} \frac{m_\Delta^2}{M} \phi^0 (\bar{d}_2^j \gamma^5 d_2^j) + \\
 & \bar{X} + (\partial^2 - M^2) X + \bar{X} - (\partial^2 - M^2) X - \bar{X}^0 (\partial^2 - \frac{M^2}{c_w^2}) X^0 + Y \partial Y + ig_{cw} W_\mu^+ (\partial_\mu \bar{X}^0 X - \\
 & \partial_\mu \bar{X}^+ X^0) + ig_{sw} W_\mu^+ (\partial_\nu \bar{Y} X^- - \partial_\nu \bar{X}^+ Y) + ig_{cw} W_\mu^- (\partial_\mu \bar{X}^- X^0 - \partial_\mu \bar{X}^0 X^+) + \\
 & ig_{sw} W_\mu^- (\partial_\mu \bar{X}^- Y - \partial_\mu \bar{Y} X^+) + ig_{cw} Z_\mu^0 (\partial_\mu \bar{X}^+ X^+ - \partial_\mu \bar{X}^- X^-) + ig_{sw} A_\mu (\partial_\mu \bar{X}^+ X^+ - \\
 & \partial_\mu \bar{X}^- X^-) - \frac{1}{2}g M [\bar{X}^+ X^+ H + \bar{X}^- X^- H + \frac{1}{c_w} \bar{X}^0 X^0 H] + \frac{1-2c_w^2}{2c_w} ig M [\bar{X}^+ X^0 \phi^+ - \\
 & \bar{X}^- X^0 \phi^-] + \frac{1}{2c_w} ig M [\bar{X}^0 X^- \phi^+ - \bar{X}^0 X^+ \phi^-] + ig M s_w [\bar{X}^0 X^- \phi^+ - \bar{X}^0 X^+ \phi^-] + \\
 & \frac{1}{2}ig M [\bar{X}^+ X^+ \phi^0 - \bar{X}^- X^- \phi^0]
 \end{aligned}$$

## Bladmuziek (J.S. Bach) bladmuziek


Allegro moderato. (♩ = 96)

The musical score is presented in a standard format with a treble clef on the upper staff and a bass clef on the lower staff. The tempo is marked 'Allegro moderato' with a metronome marking of quarter note = 96. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings like 'cresc.', 'dimin.', and 'poco cresc.'.

# Hoe zien die botsingen er nou uit ?





Simulatie top quark productie



# Hoe ontdek je nou nieuwe dingen

*Nieuwe afstandschaal EN nieuwe detector*



# Higgs $\rightarrow$ ZZ $\rightarrow$ 4 leptonen

*klein aantal schitterende botsingen*

120.000 Higgs bosonen





- Maar 1 op de 1000 Higgs bosonen vervalt naar 4 leptonen
- 50% kans dat ATLAS detector ze allemaal goed terugvindt





60 (Higgs  $\rightarrow$  4 lepton) events

'overig'	52 events
Met Higgs	68 events



# Higgs $\rightarrow$ 2 fotonen

foton



# Interpretatie overschot in ATLAS



## **Claim pas ontdekking als:**


Kans op toevallige fluctuatie zoals geobserveerd kleiner dan 1 op 1 miljoen

*8 keer 6 gooien achter elkaar*





# Een ontdekking in slow-motion

Time-line higgs ontdekking



EUROPEAN ORGANISATION FOR NUCLEAR RESEARCH (CERN)

CERN-PH-EP-2012-218  
Accepted by: Physics Letters B

---

**Observation of a New Particle in the Search for the Standard Model Higgs Boson with the ATLAS Detector at the LHC**

The ATLAS Collaboration


This paper is dedicated to the memory of our ATLAS colleagues who did not live to see the full impact and significance of their contributions to the experiment.

**Abstract**


A search for the Standard Model Higgs boson in proton-proton collisions with the ATLAS detector at the LHC is presented. The datasets used correspond to integrated luminosities of approximately  $4.8 \text{ fb}^{-1}$  collected at  $\sqrt{s} = 7 \text{ TeV}$  in 2011 and  $5.8 \text{ fb}^{-1}$  at  $\sqrt{s} = 8 \text{ TeV}$  in 2012. Individual searches in the channels  $H \rightarrow ZZ^{(0)} \rightarrow 4\ell$ ,  $H \rightarrow \gamma\gamma$  and  $H \rightarrow WW^{(0)} \rightarrow \ell\nu\ell\nu$  in the 8 TeV data are combined with previously published results of searches for  $H \rightarrow ZZ^{(0)}$ ,  $WW^{(0)}$ ,  $b\bar{b}$  and  $^-\tau^+$  in the 7 TeV data and results from improved analyses of the  $H \rightarrow ZZ^{(0)} \rightarrow 4\ell$  and  $H \rightarrow \gamma\gamma$  channels in the 7 TeV data. Clear evidence for the production of a neutral boson with a measured mass of  $126.0 \pm 0.4 \text{ (stat)} \pm 0.4 \text{ (sys)}$  GeV is presented. This observation, which has a significance of 5.9 standard deviations, corresponding to a background fluctuation probability of  $1.7 \times 10^{-4}$ , is compatible with the production and decay of the Standard Model Higgs boson.

arXiv:1207.7214v2 [hep-ex] 31 Aug 2012


# Ontdekking van het Higgs deeltje op 4 juli 2012



# Waarom is de Higgs zo bijzonder?



# Waarom is de Higgs zo bijzonder?



Higgs heeft unieke rol in de wereld van elementaire deeltjes

$\psi$ : "normale" deeltjes

$\phi$ : Higgs



De helft van het T-shirt gaat over Higgs!

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \\ & + i \bar{\psi} \not{D} \psi \\ & + \bar{\psi}_i y_{ij} \psi_j \phi \\ & + |D_\mu \phi|^2 - V(\phi) \end{aligned}$$

Quarks	$u$ up	$c$ charm	$t$ top
	$d$ down	$s$ strange	$b$ bottom

Leptons	$\nu_e$ electron neutrino	$\nu_\mu$ muon neutrino	$\nu_\tau$ tau neutrino
	$e$ electron	$\mu$ muon	$\tau$ tau

$\gamma$ photon	Force carriers
$Z$ Z boson	
$W$ W boson	
$g$ gluon	



12 deeltjes

4 krachten

+ Higgs




# Higgs en LHCb?

**m:  $\psi\psi H$**




$$\chi_i y_{ij} \chi_j \phi$$




# Higgs en LHCb?

$\Psi$ : quarks

$Y_{ij}$ : koppeling tussen verschillende quarks  $i, j$



$$\Psi_i Y_{ij} \Psi_j \phi$$




# Higgs en LHCb?

$\Psi$ : quarks

$Y_{ij}$ : koppeling tussen verschillende quarks  $i, j$




$$\mathcal{L} = \bar{\psi}_i Y_{ij} \psi_j + \phi$$





# Higgs en LHCb?


Quark koppelingen:



Waarom dit patroon in quark koppelingen?

Waarom dit patroon in quark massa's?

→ **Is er een verband?**



# Nog een paar 'kleine' dingetjes:

**1**

Waar is alle anti-materie gebleven ?

**2**

80% van de materie in het heelal is onbekend  
→ donkere materie

**3**

Higgs boson en quark koppelingen?  
(wat is het verband) ?



- waarom past gravitatie niet in SM, extra dimensies, waarom 3 families, fermionen fundamentele deeltjes, supersymmetrie, protonen stabiel, quantisatie elektrische lading, exploderende quantumcorrecties, kleine neutrino massa's, string theorie, ...

# Higgs en het Universum

# Higgs: Deeltje? Veld?

## Deeltje

Foton (lichtdeeltje)





## Veld

Elektrisch veld




# Waarom is de Higgs zo bijzonder?

## Deeltje



## Veld



Alsof de vis het water heeft ontdekt...

# Het Higgs veld – kun je het zien?

Het Higgs veld is uniform – als het meer in deze foto

Het maken van een Higgs deeltje is als een rimpeling op het meer

**De theorie van Higgs:**  
als het veld bestaat is er  
ook een bijbehorend deeltje





# Wat is massa ?? Anno 1964

Massa van elementaire deeltjes komt door  
"wrijving" met alomtegenwoordig 'Higgs veld'

$$m: \psi\psi H$$




$$\mathcal{L} = y_{ij} \psi_i \psi_j \phi$$



Nee, dit is niet Pierre, dit is John Ellis


# Wat is massa ?

Massa van elementaire deeltjes komt door

“wrijving” met alomtegenwoordig ‘Higgs veld’

## Einstein:


proton massa =  
bindings energie



Elementair deeltje  
in lege ruimte:  
geen rust-energie=  
**geen massa**



Elementair deeltje  
in Higgs veld:  
rust energie =  
interactie met Higgs veld  
**= massa**






Revolutionair – met spectaculaire consequenties :

de ruimte is *niet* leeg, maar gevuld met soort ‘ether’




Als de marslander  
leven vindt ...



... heb je 1000  
nieuwe vragen


# Kloppen Higgs' eigenschappen ?

$m_h = 125 \text{ GeV}$



*voorspelling*

Standaard Model



*meting*

# Kloppen Higgs' eigenschappen ?

Zijn er nog meer soorten Higgs deeltjes ?

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\text{susy}} = & -\frac{g^2}{8} (H_u^\dagger \sigma^a H_u + H_d^\dagger \sigma^a H_d)^2 - \frac{g'^2}{8} (H_u^\dagger H_u - H_d^\dagger H_d)^2 \\ & + \lambda_{ij}^u H_u^T \epsilon \bar{u}_i q_j - \lambda_{ij}^d H_d^T \epsilon \bar{d}_i q_j - \lambda_{ij}^e H_e^T \epsilon \bar{e}_i \ell_j \\ & - \frac{H_u^\dagger}{\sqrt{2}} (g \sigma^a \bar{W}^a + g' \bar{B}) \bar{H}_u - \frac{H_d^\dagger}{\sqrt{2}} (g \sigma^a \bar{W}^a - g' \bar{B}) \bar{H}_d + \text{h.c.}\end{aligned}$$


**Een stap verder...**




# Een ander veld: de Big Bang


Een van Higgs' eigenschappen komt overeen met een ander veld...

Het *inflaton* dat de het heelal opblies tussen  $10^{-33}$  en  $10^{-32}$  seconde na de Big Bang



# Een ander veld: de Big Bang





# Higgs:

**1**

Een Higgs deeltje gevonden in Geneve

**2**

Heelal gevuld met Higgs veld

**3**

Kloppen zijn eigenschappen?



# Nog een paar 'kleine' dingetjes:

4

80% van de materie in het heelal is onbekend  
→ donkere materie

5

Waar is alle anti-materie gebleven ?

6

Higgs boson (hoe krijgen deeltjes massa) ?

- waarom past gravitatie niet in SM, extra dimensies, waarom 3 families, fermionen fundamentele deeltjes, supersymmetrie, protonen stabiel, quantisatie elektrische lading, exploderende quantumcorrecties, kleine neutrino massa's, string theorie, ...

**EINDE**

# Wat is het nut van dit onderzoek?

## Fundamenteel onderzoek

- Kan leiden tot verrassingen,
  - Soms zelfs nuttig...
  - Maar per definitie van te voren onbekend





*“Oneindig veel toegepast onderzoek aan de kaars zou ons nooit het elektrische licht hebben gebracht.”*



# Wat is het nut van dit onderzoek?

## Fundamenteel onderzoek

- Kan leiden tot verrassingen,
  - Soms zelfs nuttig...
  - Maar per definitie van te voren onbekend




“Zonder relativiteitstheorie zit de GPS er 10km/dag naast!”





# LHCb: Hoe verder?

- Preciezer! → Upgrade (2018)



Type	Observable	Current precision	LHCb 2018	Upgrade (50 fb <sup>-1</sup> )	Theory uncertainty
$B_s^0$ mixing	$2\beta_s (B_s^0 \rightarrow J/\psi \phi)$	0.10 [30]	0.025	0.008	$\sim 0.003$
	$2\beta_s (B_s^0 \rightarrow J/\psi f_0(980))$	0.17 [32]	0.045	0.014	$\sim 0.01$
	$a_{sl}^s$	$6.4 \times 10^{-3}$ [63]	$0.6 \times 10^{-3}$	$0.2 \times 10^{-3}$	$0.03 \times 10^{-3}$
Gluonic penguins	$2\beta_s^{\text{eff}}(B_s^0 \rightarrow \phi\phi)$	–	0.17	0.03	0.02
	$2\beta_s^{\text{eff}}(B_s^0 \rightarrow K^{*0}\bar{K}^{*0})$	–	0.13	0.02	$< 0.02$
	$2\beta_s^{\text{eff}}(B^0 \rightarrow \phi K_S^0)$	0.17 [63]	0.30	0.05	0.02
Right-handed currents	$2\beta_s^{\text{eff}}(B_s^0 \rightarrow \phi\gamma)$	–	0.09	0.02	$< 0.01$
	$\tau^{\text{eff}}(B_s^0 \rightarrow \phi\gamma)/\tau_{B_s^0}$	–	5 %	1 %	0.2 %
Electroweak penguins	$S_3(B^0 \rightarrow K^{*0}\mu^+\mu^-; 1 < q^2 < 6 \text{ GeV}^2/c^4)$	0.08 [64]	0.025	0.008	0.02
	$s_0 A_{\text{FB}}(B^0 \rightarrow K^{*0}\mu^+\mu^-)$	25 % [64]	6 %	2 %	7 %
	$A_{\text{I}}(K\mu^+\mu^-; 1 < q^2 < 6 \text{ GeV}^2/c^4)$	0.25 [9]	0.08	0.025	$\sim 0.02$
	$\mathcal{B}(B^+ \rightarrow \pi^+\mu^+\mu^-)/\mathcal{B}(B^+ \rightarrow K^+\mu^+\mu^-)$	25 % [29]	8 %	2.5 %	$\sim 10\%$
Higgs penguins	$\mathcal{B}(B_s^0 \rightarrow \mu^+\mu^-)$	$1.5 \times 10^{-9}$ [4]	$0.5 \times 10^{-9}$	$0.15 \times 10^{-9}$	$0.3 \times 10^{-9}$
	$\mathcal{B}(B^0 \rightarrow \mu^+\mu^-)/\mathcal{B}(B_s^0 \rightarrow \mu^+\mu^-)$	–	$\sim 100\%$	$\sim 35\%$	$\sim 5\%$
Unitarity triangle angles	$\gamma (B \rightarrow D^{(*)}K^{(*)})$	$\sim 10\text{--}12^\circ$ [40, 41]	$4^\circ$	$0.9^\circ$	negligible
	$\gamma (B_s^0 \rightarrow D_s K)$	–	$11^\circ$	$2.0^\circ$	negligible
	$\beta (B^0 \rightarrow J/\psi K_S^0)$	$0.8^\circ$ [63]	$0.6^\circ$	$0.2^\circ$	negligible
Charm	$A_\Gamma$	$2.3 \times 10^{-3}$ [63]	$0.40 \times 10^{-3}$	$0.07 \times 10^{-3}$	–
CP violation	$\Delta A_{CP}$	$2.1 \times 10^{-3}$ [8]	$0.65 \times 10^{-3}$	$0.12 \times 10^{-3}$	–


# LHCb: Upgrade - Trigger

- Precisie meting → Meer luminositeit
- Meer luminositeit → ~~Hogere trigger rate~~
- Meer luminositeit → Hogere threshold
- Hogere threshold → ~~Minder events ...~~

## Oplossing:

Slimmere trigger → *alle* events naar CPU farm:



➤ Readout @40 MHz, niet 1 MHz ...



# LHCb: Upgrade - Detectors

- Precisie meting → Meer luminositeit
- Meer luminositeit → Hogere particle rate
- Hogere particle rate → **Occupancy te hoog** in de Outer Tracker

➤ 2 opties:



Beslissing in 2013

1) Inner Tracker wordt Scintil. Fiber,  
Outer Tracker wordt *minder*

2) Inner Tracker wordt groter,  
Outer Tracker wordt *kleiner*